

INFORME SEMANAL N° 1220

Fecha: 26 de febrero de 2026

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2026
Detalles: Las precipitaciones que se representan en el mapa corresponden al evento pluvial que se concretó entre miércoles y jueves de la semana pasada principalmente, aunque algunos sectores sumaron también durante el lunes o martes, hasta cuando se mantuvo la inestabilidad. Estas lluvias forman parte de un extendido período húmedo que comenzó a alternar eventos sobre el territorio entrerriano ya desde la transición quincenal.
Como podemos observar en el mapa, muchas zonas de la provincia acopiaron lluvias que superan los cien milímetros, en algunos casos holgadamente. Se mantuvo el gradiente deficitario de las precipitaciones sobre el sudeste de la provincia, con un corte bien marcado hacia milimetrajes más modestos que se asemejan a los que se vienen registrando en las vecindades de BA. Es decir, mientras gran parte de la provincia ha logrado incorporarse a las lluvias del litoral, significativamente más abundantes, el sudeste ha quedado acoplado al déficit bonaerense.
El desempeño de las lluvias que vimos en la mayor parte de ER durante estos últimos diez días no ha sido tan generoso y generalizado sobre la zona núcleo. Las mejoras han aparecido, pero han quedado lejos de lograr la recuperación de perfiles que se ha visto sobre la provincia de ER.
Durante las últimas jornadas, se viene imponiendo un importante cambio en la circulación de aire. Ha llegado a la provincia aire de origen patagónico, más frío y seco. Sin embargo, la mezcla de aire resultante no es muy estable, es por eso que no se descartan chaparrones dispersos en la noche de hoy. Esto antecede al reposicionamiento de aire tropical que se sentirá con mayor presencia durante el domingo y el comienzo de la semana próxima. Se espera que desde el martes la acumulación de humedad sea importante en todo el litoral, esto debería ir configurando un escenario propicio para el regreso de lluvias de peso para dentro de una semana.


PRECIPITACIÓN ACUMULADA
18/02/26 al 24/02/26 (9hs 25/02)
CCA
200 mm
190 mm
180 mm
170 mm
160 mm
150 mm
140 mm
130 mm
120 mm
110 mm
100 mm
90 mm
80 mm
70 mm
60 mm
50 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm

Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 25 DE FEBRERO DE 2026
Detalles: Las reservas de humedad han alcanzado un valor adecuado en la mayor parte del territorio, prevaleciendo áreas reducidas donde subsisten los excesos hídricos. Hacia el sudeste, no sorprende el ajuste de las reservas hasta el nivel de sequía que se mantiene sobre la mayor parte de Gualeguaychú, donde apenas se han sumado cincuenta milímetros en lo que va del mes.
Las condiciones ambientales actuales favorecen un aprovechamiento pleno de las recientes recargas de humedad. No se están dando condiciones de exigencia térmica, aunque esto es transitorio como acabamos de describir en el pronóstico para la próxima semana.
En principio, para el recorrido del último tramo de la campaña, no se perfila el regreso a un comportamiento pluvial deficitario. Deberíamos ver una mejora para los sectores que quedaron desacoplados de la recuperación pluvial de febrero.
Normalmente el mes de marzo es un mes de mayor inestabilidad, sobre todo en la segunda quincena, que suele dar inicio a la transición estacional. El cambio verano otoño, favorece un mayor nivel de actividad atmosférica y esto por lo general se refleja en un crecimiento del volumen de lluvia. Esta dinámica, define estadísticas de lluvia que en general se ubican por encima de los ciento treinta milímetros (como valor piso) en la mayor parte del territorio. De validarse las lluvias previstas para dentro de una semana, estaríamos comenzando a sumar de buena forma para acercarnos a la estadística del mes de marzo.
En cuanto a temperaturas, todavía tenemos por delante semanas con predominio de aire tropical que seguramente favorecerán el retorno de un ambiente más exigente. Mientras no tengamos condiciones dinámicas desfavorables, el reposicionamiento de aire tropical en forma recurrente, es el sostén primario de los sistemas precipitantes que deben llegar durante el mes de marzo. Por lo pronto vemos una primera semana del mes con tendencia a satisfacer el comportamiento pluvial esperado.


ESTADO DE LAS RESERVAS
al 25/02/26
CCA
EXCESOS
RESERVA EXCESIVA
RESERVA ÓPTIMA
RESERVA ADECUADA
RESERVA REGULAR
RESERVA ESCASA
SEQUÍA
METODO FORTE LAY

Sección: COSECHA DE MAÍZ DE PRIMERA

En la provincia de Entre Ríos, la superficie sembrada con maíz de primera en el ciclo 2025/26 fue de 532.850 ha.

Luego de las cuantiosas precipitaciones registradas del 11 al 17 de febrero, se generó un importante movimiento de las máquinas cosechadoras. En función de consultas realizadas a la red de colaboradores, se determinó que a nivel provincial se cosechó el 56 %, es decir, una superficie equivalente a 300.000 ha.

En la Figura 1 se detalla el avance de cosecha y el rendimiento promedio obtenido por zonas en la provincia de Entre Ríos.




Figura1: Avance de cosecha del maíz de primera y rendimiento promedio obtenido por zonas en la provincia de Entre Ríos.

El rendimiento promedio provincial se posiciona cercano a 6.500 kg/ha. Este valor representa una caída interanual del 3 % (200 kg/ha) con respecto al ciclo anterior. Sin embargo, en relación con el promedio del último lustro (4.896 kg/ha), implica un incremento del 33 % (1.604 kg/ha).

El Sur lidera claramente el avance de cosecha con el 80 %, asociado a la menor ocurrencia de lluvias, lo que permitió mayor continuidad en las labores. No obstante, presenta los menores rendimientos, con un valor promedio de 5.900 kg/ha, producto del pulso seco ocurrido durante la floración.

Por otra parte, el menor avance se observa en el sector Oeste, con el 34 %, aunque registra el rendimiento promedio más elevado, con 7.500 kg/ha.

De mantenerse esta tendencia en los rendimientos y descontando aproximadamente 8.000 ha que normalmente se destinan al consumo animal (grano húmedo o elaboración de silos), la producción provincial se estimaría en 3.411.525 toneladas. Esto representaría un incremento interanual del 82 % (1.537.460 t), considerando que en el ciclo 2024/25 la producción fue de 1.874.065 t.

Finalmente, los colaboradores mencionan que, debido a las fuertes ráfagas de viento, en algunos lotes se produjo el vuelco de plantas (ver Figura 2).




Figura 2: Lote de maíz de primera volcado por efecto del viento en el departamento Federación. Gentileza: Ing. Agr. Ricardo Saires.

Sección: RED DE MONITOREO DE CHICHARRITA -INTA, CENTRO REGIONAL ENTRE RÍOS

Información sobre *Dalbulus maidis* en cultivos de maíz y alfalfa en Entre Ríos

42do INFORME- PERÍODO 24 al 26 de febrero de 2026

Se detectó la presencia de *Dalbulus maidis* en 12 lotes de maíz, hallándose adultos de chicharritas en los maíces de segunda/tardío. Asimismo, en dos lotes de alfalfa (Nogoyá y La Paz), no se registraron chicharritas adultas en los muestreos con red de arrastre (Ver mapa).



A continuación, se detallan los estados fenológicos y los valores correspondientes a la densidad poblacional de adultos de chicharritas por planta (Tabla 1, observación directa, 50 plantas de maíz o 160 golpes de red). Además, se presentan datos provenientes de las capturas en trampas cromáticas adhesivas (Tabla 2), pertenecientes a profesionales del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria (CIAV), de la AER Victoria y de la EEA Paraná del INTA.

Tabla 1. Densidad de chicharrita por planta de acuerdo con el sitio monitoreado y el estado fenológico del cultivo de maíz.

Sitio	Estado Fenológico	Densidad (chicharrita/pl.)
Concordia	V6	1,620
María Grande	V7	1,200
Crespo	VT	0,440
Gualeguaychú	R1	0,000
Villaguay	R1	0,400
Gualeguay	R2	0,040
Paraná	R3	0,327
Diamante	R5	0,021

Tabla 2. Densidad de chicharrita por trampa cromática adhesiva de acuerdo con el sitio monitoreado o nombre del Establecimiento, cultivo y estado fenológico.

	Sitio	Cultivo-EF	Densidad (chicharrita/trampa)
Departamento Victoria	Don Bernardo	Maíz R2	25
	San Carlos	Maíz R2	6
	La Querencia	Maíz R1	1
	Febre	Maíz R2	4
Departamento Paraná	EEA Paraná	Maíz R3	226

Consideraciones:

- **Hasta el momento, en los lotes donde se realizan los monitoreos, no se observan en las plantas de maíz síntomas compatibles con las enfermedades transmitidas por las chicharritas.**
- **Se sugiere intensificar los monitoreos, especialmente, en los lotes de maíz de segunda o tardío, a partir de la emergencia del cultivo hasta V8-V10.**
- Seguir los Informes de la Red Nacional de Monitoreo mediante trampas cromáticas adhesivas (https://www.argentina.gob.ar/red-nacional-de-monitoreo-informes).

Sección: COSECHA DE ARROZ

La superficie sembrada con arroz en el ciclo 2025/26 en la provincia de Entre Ríos fue de 59.000 ha. Desde el último relevamiento, el cultivo avanzó en su desarrollo y actualmente los lotes se encuentran mayoritariamente en etapas de llenado de grano a madurez fisiológica. En este contexto, durante los últimas semanas se dio inicio a la cosecha en algunos sectores de la

provincia, aunque las labores son aún incipientes y avanzan lentamente.

Al momento, no se dispone de información representativa sobre los rendimientos, dado que no se registran lotes cerrados. Los colaboradores indican humedades de grano en torno al 21–22 %, con buenas calidades generales, aunque con rindes preliminares por debajo de lo esperado en algunas zonas. Asimismo, se reportaron daños puntuales por granizo asociados al último evento de precipitaciones.

Sección: COSECHA DE SORGO

Se inició la cosecha de los primeros lotes de sorgo en la provincia de Entre Ríos, no obstante, la mayor parte del área se encuentra desde pleno llenado de granos a madurez fisiológica.

Cabe recordar que, la superficie implantada con sorgo en la provincia para el ciclo 2025/26 se estima en 55.000 hectáreas, lo que implica una retracción del 55 % en comparación con la campaña previa. Del total, el sorgo granífero concentraría el 56 % del área (31.000 ha), mientras que el 44 % restante (24.000 ha) correspondería a planteos de doble propósito o forrajeros.

Sección: BOLSACER EN EXPOAGRO


BOLSACER
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS
AGENDÁ NUESTRAS
CHARLAS
Proyecciones de la Producción Agrícola 2025/26 en Entre Rios
Ing. Agr. Pablo Fontanini
Transformación Digital de la Red Meteorológica BolsaCER
Ing. Sistemas Luis Altamirano
Jueves 12/03
12:00
Stand de Entre Ríos
Expoagro
EDICIÓN
YPF agro