

Informe del Estado de las Reservas y de los Cultivos al 30/07/2009.

Fecha: 30 de julio de 2009

Lluvias: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 30/07/2009

Detalles: <p style="text-align: justify;">Luego de las cuantiosas lluvias de la semana pasada, se produjo un importante cambio en las condiciones ambientales producto del ingreso de una masa de aire de origen polar. Además del fuerte descenso en las temperaturas, el aire húmedo se replegó al sur de Brasil o a las zonas tropicales. Como resultado de esta irrupción de aire frío, se observaron heladas de importancia principalmente en el centro sur de la provincia. En el resumen estadístico de la semana la temperatura media resultó hasta cuatro grados por debajo de los valores normales. Estas condiciones comenzaron a moderarse durante el fin de semana y se está transitando un período que muestra un régimen térmico más cercano al normal. En las próximas jornadas se mantendrá este régimen térmico, definiendo un ambiente confortable con amaneceres fríos a frescos.
Con pocas exigencias de las coberturas y la atmósfera, las reservas de humedad se mantienen en un nivel óptimo, persistiendo los suelos saturados principalmente en el sudeste de la provincia. Los departamentos Nogoy, Tala, Paran, Victoria y Diamante, han recuperado completamente el perfil de humedad con las últimas lluvias y pueden transitar el resto del invierno sin mayores demandas hídricas. El norte presenta un estado de humedad adecuado.
Como dijimos anteriormente, el aire húmedo se ha retirado hacia el norte. Es poco probable que se observen lluvias hasta cerrar el próximo informe el martes 4. Son bajas las chances de lluvias ligeras sobre el norte de la provincia para aquella jornada o la del miércoles. Los sistemas precipitantes generalizados, aunque menos importantes que el último, regresarán a partir del viernes de la semana próxima.</p>



ESTADO DE LAS RESERVAS al 30/07/09



- EXCESOS
- RESERVA EXCESIVA
- RESERVA ÓPTIMA
- RESERVA ADECUADA
- RESERVA REGULAR
- RESERVA ESCASA
- SEQUÍA

METODO
FORTE LAY
AIELLO

Reservas: DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS DOS ÚLTIMAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS EN ENTRE RÍOS

Detalles: El siguiente cuadro compara los datos estadísticos finales de trigo, lino, girasol, maíz, soja, sorgo y arroz de las últimas campañas agrícolas en Entre Ríos.

Cultivo	2007/08 Sup. Sembrada (ha)	2008/09 Sup. Sembrada (ha)	2008/09 Sup. Cosechada (ha)	2008/09 Variación Sup. (%)	2007/08 Producción (Tn)	2008/09 Producción (Tn)
Trigo	312.320	254.993	222.702	-18,36%	879.285	480.649
Lino	6.080	14.850	14.790	144,24%	5.416	15.724
Girasol	72.695	47.366	44.266	-34,84%	139.499	51.888
Maíz	189.240	152.097	89.927	-19,63%	912.455	212.069
Soja	1.307.995	1.117.660	970.060	-14,55%	2.979.275	1.059.992
Sorgo	97.165	103.575	82.590	6,60%	447.542	301.449
Arroz	71.770	87.012	82.712	21,24%	515.795	595.905

Sección: TRIGO

Los lotes de trigo que fueran implantados con cultivares de ciclos largos presentan fenológicamente un rango que va desde macollaje a inicios de encañazón, mientras que los de ciclo intermedio a corto abarcan desde emergencia hasta inicios de macollaje.

El estado general y la sanidad del cultivo mantienen la condición de "Bueno" a "Muy Bueno" existiendo una adecuada densidad de plantas y óptima humedad edáfica para la continuidad de su desarrollo.

Con respecto a las bajas temperaturas, los colaboradores comunican que no han tenido impacto importante, salvo en algunos casos que han producido el amarillamiento y quemado en las puntas de las hojas superiores. Además en los últimos lotes implantados que cuentan con muy buena cobertura se nota lentitud en la emergencia por el enfriamiento del suelo, indicándose que ambos inconvenientes no tienen carácter significativo.

Se está realizando la aplicación de fertilizantes nitrogenados con dosis muy variables, para el caso de la UREA las mismas oscilan desde los 50 kg/ha hasta 150 kg/ha y para el caso del UAN entre 100 lts/ha a 150 lts/ha.

Sección: LINO


La fenología de la oleaginosa abarca desde 2 pares de hojas hasta un desarrollo que alcanza los 10 a 12 cm de altura.

Con respecto al efecto de las heladas los Colaboradores reportan que en las últimas hectáreas sembradas se detecta la muerte de plántulas en los lotes que se encontraban desde emergencia a 2 a 3 pares de hojas; fundamentalmente en las chacras que contaban con mucha cobertura de rastrojos, donde el efecto de las heladas se hizo más intenso.


En el departamento Villaguay y Tala los daños se ubican desde el 15% al 30% de pérdidas de plantas con respecto a la densidad total. Los mayores perjuicios se reportan en el departamento Nogoyá donde la pérdida de plantas alcanzan hasta el 50% del stand, en una superficie que abarca aproximadamente 35% de lo sembrado.

Los Ingenieros están evaluando la evolución del cultivo luego de las lluvias ya que en general se habían logrado muy buenos nacimientos por lo tanto en muchos casos la pérdidas no afectarían significativamente el rendimiento potencial.


Sección: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2009



Sección:




Sección:




Sección:


Otro período de frío intenso sobre toda la provincia, con una baja amplitud térmica entre las mínimas diarias, que fueron inferiores a los 5°C bajo cero y las máximas, que si bien alcanzaron durante algún momento los 17°C, estuvieron mayormente bastante por debajo de esa marca, así lo demuestra la temperatura media diaria que solo llegó superar por escaso margen los 6°C. Esta baja amplitud térmica y las temperaturas bajo cero causaron la constante presencia de heladas, de mayor o menor intensidad, en toda la región.



Sección:



Sección:



Sección:

Durante los últimos siete días predominó el clima frío y seco. La tasa de radiación solar media registrada fue excelente y superó los registros medios históricos para esta época del año. La ausencia de precipitaciones disminuyó fuertemente la Humedad Relativa media que estuvo en el orden del 67%. También las horas de mojado foliar acumuladas sufrieron un descenso importante en comparación con el periodo anterior y en general se ubican en valores bajos.