

---

## INFORME SEMANAL N° 639


Fecha: 8 de enero de 2015

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 06 DE ENERO DE 2015

Detalles: <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">La transición interanual mantuvo la inestabilidad de la última parte de diciembre y a lo largo de los primeros días de enero, el calor y la humedad consolidaron una dinámica que facilitó la producción de nuevos sistemas precipitantes, en este caso con importantes celdas de tormenta que atravesaron todo el territorio entrerriano durante la última parte del martes, dejando copiosas precipitaciones en gran parte de la provincia.</span><br /><span style="font-size: small;">Lo más interesante del último evento pluvial fue que las lluvias invirtieron el patrón que se venía observando en diciembre y en este caso fue en el sur de la provincia donde se concretaron los corredores con los acumulados más destacados. El máximo absoluto se ubica en la zona de influencia de Gualeguaychú, donde se acumularon casi 170 milímetros en 24 horas, es decir unos 40 milímetros más que la media mensual del mes de enero. Salvando esta reacción reducida donde el efecto de las lluvias pudo haber sido perjudicial, la oferta de agua en el sudoeste provincial ha sido claramente beneficiosa y da una holgura ambiental que se magnifica cuando se recuerda el comienzo de 2014.</span><br /><span style="font-size: small;">Las tormentas del martes tomaron rumbo todo el sur provincial, con una celda muy destacada sobre Gualeguaychú y una provisión de agua que corrió hacia el norte por los departamentos del oeste. En esta ocasión la menor oferta de agua se observó del centro para el noreste provincial, aunque debemos destacar que la oferta de agua más la reserva acopiada previamente, han sostenido favorablemente el desarrollo de los cultivos.</span><br /><span style="font-size: small;">Las perspectivas de corto plazo mantienen el tiempo inestable y la posibilidad de lluvias. Seguramente en el informe de la semana próxima no se repetirá un mapa con una oferta tan generosa como la del período que estamos analizando, sin embargo está claro que las condiciones atmosféricas son favorables como para que se mantenga la alta frecuencia de precipitaciones.</span></p>



## PRECIPITACIÓN ACUMULADA 29/12/14 al 06/01/15 (9hs 07/01)




---

## Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 07 DE ENERO DEL 2015

Detalles: <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Las lluvias recientes han fortalecido el panorama sobrado de humedad que transita la provincia, incluyendo en este caso algunos excesos en los departamentos del sur, los cuales se acoplan a los del norte, recurrentes en la <u>ltima parte del a<tilde>o pasado.</span><br /><span style="font-size: small;">Ha sido muy oportuno el cambio de distribuci<u>n del <u>ltimo evento, ya que potencia el desarrollo de los cultivos con alta demanda. El ma<u>z sembrado en forma tard<u>a recibe estas lluvias de muy buen grado, ya que lo acompa<u>a en su tr<u>nsito por su per<u>odo de floraci<u>n. Los ma<u>ces sembrados en fecha temprana, no debieron padecer estr<u>s h<u>drico incluso en el sudoeste, ya que siempre contaron con buenas reservas.</span><br /><span style="font-size: small;">El mapa ofrece un panorama muy satisfactorio para el desarrollo de los cultivares de soja y otras especies veraniegas. Si reconocemos al ma<u>z como el cultivo que actualmente tiene mayor demanda y para el mismo el agua est<u> lejos de escasear, podremos concluir el paso sobrado que llevan los cultivares de la oleaginosa.</span><br /><span style="font-size: small;">Para esta fecha del a<tilde>o pasado la disponibilidad de humedad era muy ajustada y la provincia, como gran parte de la zona agr<u>cola del pa<u>s, sufr<u>a el embate de las olas de calor. El patr<u>n actual dista mucho de aquella hostilidad ambiental que sufr<u>an los cultivos y de no mediar cambios significativos, es posible que la campa<u>a se encamine hacia niveles de producci<u>n que superen la barrera de los valores normales.</span><br /><span style="font-size: small;">El acopio de reservas en esta <u>poca del a<tilde>o es vital para compensar el m<u>ximo grado de exigencia atmosf<u>rica. Si consideramos que las temperaturas son mayormente benignas, que las lluvias tienen alta frecuencia y por sectores son muy sobradas, el balance h<u>drico se mantendr<u> con un piso que garantiza la demanda de los cultivos. Los riesgos de estr<u>s h<u>drico parecen<u> disminuidos en esta campa<u>a.</span></p>




# ESTADO DE LAS RESERVAS al 07/01/15



METODO  
FORTE LAY  
AIELLO

## Sección: CONDICIÓN DE SOJA DE PRIMERA



En la geografía entrerriana el panorama general de la oleaginosa es prometedor, considerando un área implantada que se ubicaría alrededor de 1.180.000 ha, se ha estimado que el 91% de la superficie cuenta con una condición calificada entre buena y muy buena, regular el 8% y mala el 1% restante. (ver Mapa N° 1).


El estado fenológico es muy amplio y abarca desde lotes que están siendo resebrados (fundamentalmente hacia el centro-norte) hasta los grupos de madurez cortos implantados en octubre que se encuentran en inicios de llenado de granos; concentrándose la mayor parte de las chacras entre vegetativo a inicios de floración.

### Sección:


Cabe aclarar, que si bien a nivel global la oleaginosa evoluciona favorablemente, la distribución y la cuantía de las precipitaciones han generado dos escenarios desiguales entre el centro – sur y el centro – norte del territorio.

Por un lado, el centro-sur que abarca aproximadamente el 68% del área cultivada con soja de primera y está conformado por el sector oeste (Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá) y el sector sur (Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú y Tala) poseen entre el 44% al 52% del área en una condición muy buena.

Mientras que el centro-norte que ocupa alrededor del 32% de lo implantado y que agrupa al sector norte (La Paz, Villaguay, Federal y Feliciano) y al sector este (San Salvador, Colón, Concordia y Federación) presenta tan solo entre el 3% y 16% en una condición evaluada como muy buena, (ver Gráfico Nro. 1).



Sección: AVANCE DE SIEMBRA DE SOJA DE SEGUNDA




A partir del mes de diciembre las reiteradas precipitaciones han generado demoras en la siembra de soja de segunda e incluso en sitios puntuales la misma se ha paralizado (fundamentalmente hacia el centro – norte del territorio).

A pesar de este inconveniente climático, en el ámbito provincial se ha implantado alrededor del 90% de la intención de siembra que se posiciona alrededor de 270.000 ha. Es difícil determinar si esta intención será concretada, ya que en algunos casos los productores han optado por sembrar maíz o sorgo en lugar de la oleaginosa.

En el Mapa N° 2 se muestra el grado de avance en las labores de siembra en cada sector del territorio.

## Sección: CONDICIÓN DE MAÍZ DE PRIMERA



En base a las consultas efectuadas a la Red de Colaboradores se analizó el estado general del cultivo de maíz en la provincia. concluyéndose que aproximadamente el 98% del área sembrada posee una condición de buena a muy buena, existiendo alrededor del 2% en situación regular. Cabe mencionar que la superficie sembrada para esta campaña es de aproximadamente 165.000 ha.


En el Mapa N° 3 se muestra la condición del cereal por sectores, donde se puede apreciar que en el este del territorio (Federación, Concordia, Colón y San Salvador) es donde el estado regular es más elevado con un 8%; mientras que en el resto de la provincia los porcentajes en dicha condición son insignificantes. Esto se debe a que en la zona este se presentaron inconvenientes por las excesivas lluvias, las cuales generaron anegamientos temporarios que repercutieron en el número de plantas logrado por hectárea y además hubo dificultades para el control de malezas y mayor presión de insectos.

Actualmente existen muy buenas expectativas de rendimiento, proyectándose que el promedio provincial podría oscilar entre 7.500 kg/ha y 8.000 kg/ha.

Es importante mencionar que si bien los factores climáticos de precipitación y temperatura han sido muy favorables para el maíz, la clave para la manifestación del máximo potencial este año estará asociado con el nivel de fertilización, ya que la baja cotización del cereal hizo que los productores en algunos casos no aplicaran las dosis requeridas.

## Sección: AVANCE DE SIEMBRA DE MAÍZ TARDÍO Y DE SEGUNDA






La siembra de maíz de segunda y tardío alcanzó un avance del 83% de la superficie total planificada, que para la actual campaña se ubicaría cercana a las 52.000 hectáreas.

El estado fenológico engloba estadíos desde VE (emergencia) hasta V5 (cinco hojas desarrolladas).

En general la germinación y emergencia han sido muy buenas, con un correcto stand de plantas, aunque existen dificultades en lo referente al control de malezas como resultado de las reiteradas precipitaciones que impiden el ingreso de las pulverizadoras a los lotes.

### Sección: CONDICIÓN DEL SORGO



Al evaluar la condición del cultivo de sorgo de primera se encuentra que el 38% del área sembrada se califica como muy buena, 61% como buena y el 1% restante como regular (Gráfico N° 2). Algunas de las causas de la situación regular han sido: dificultad en el control de malezas, problemas de emergencia y ataques de «cogollero». El estado fenológico del cultivo incluye lotes desde V4 hasta hoja bandera.

En lo que respecta al cultivo de sorgo de segunda o tardío se están realizando las tareas de siembra con algunas dificultades debido a las precipitaciones. Cabe aclarar que la fecha de siembra tardía presenta condiciones ambientales menos favorables para la obtención de altos rendimientos.

### Sección: CONDICIÓN DE GIRASOL

El cultivo evoluciona favorablemente, sin presentar inconvenientes por enfermedades o insectos plagas. Aunque cabe recordar que tan solo se implantaron alrededor de 1.300 ha, de las cuales más del 85% fueron sembradas en el departamento La Paz.

El estado fenológico se ubica en pleno llenado de granos, estimándose que la cosecha iniciaría hacia finales del mes en curso, proyectándose un rendimiento de aproximadamente 2.000 kg/ha.

### Sección: TORMENTA Y GRANIZO

El primer día del año 2015 se presentó con precipitaciones de variada intensidad, fundamentalmente hacia el sector sureste de la provincia, detectándose la caída de granizo en sitios muy puntuales de los departamentos Gualeguay y Uruguay.

Hasta el momento la superficie afectada es escasa, reportándose daños en soja que van desde 5% al 10%; no obstante cabe aclarar que hubo pérdidas total en algunos casos, (ver Fotografía).

En lotes con maíz también se observaron pérdidas de rendimiento que podrían oscilar entre 500 kg/ha a 1.000 kg/ha.

En base a los datos aportados por la Red de Centrales Meteorológicas Automáticas de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos se pudo apreciar que la velocidad del viento comenzó a incrementarse a partir de las 9 de la mañana, detectándose las ráfagas máximas hacia el medio día, que oscilaron entre 60 km/h y 80 km/h.

Hacia el sur del departamento Uruguay, las ráfagas de viento produjeron defoliación en soja y maíz tardío, pero al encontrarse los cultivos en estado vegetativo se estima que la afectación no será significativa.



## Sección: ALERTA SANITARIO PARA TIZON FOLIAR Y ROYA COMÚN DEL MAÍZ


*Con la finalidad de seguir brindando desde este espacio mayor información técnica que pueda ser útil en el desarrollo de las labores inherentes al sector agrícola y tomando como base principal los datos de las variables climáticas obtenidos de nuestra Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas, los que complementados con otras variables de la Red de Centrales de la Dirección de Hidráulica del Gobierno de Entre Ríos, se inicia el ALERTA DE ENFERMEDADES EN CEREALES para el ciclo 2014/15.*

*Esta actividad semanal, se realiza en forma conjunta entre los profesionales del SIBER de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Ing. Agr. Norma Formento del INTA-EEA Paraná y los integrantes de Campo Global, Ings. Agrs. Pablo Glagovsky, Esteban Cabrera y Nicolás Ríos, integrantes de la Red de Colaboradores del SIBER.*

Los maíces de primera, en general se encuentran en madurez fisiológica con estado sanitario muy bueno, aun

cuando se han observado lotes con presencia de roya común (*Puccinia sorghi*), tizón foliar (*Exserohilum turcicum*) y mancha ocular (*Kabatiella zaeae*) sin probables efectos sobre el rendimiento final del cultivo. El área foliar verde remanente está sana con algunos "lunares blancos" y senescencia marcada de la 3 hojas inferiores. Es posible que no haya ocurrido removilización de fotoasimilados desde el tallo y es alta incidencia de la mancha violeta de las vainas donde se observa la presencia de *Fusarium* spp. y *Gibberella* spp. (Foto N° 2), cuya importancia se desconoce, pero es altamente probable que tenga implicancia en la epidemiología de las enfermedades de las espigas.

El alerta para las enfermedades más importantes del maíz, indica riesgo medio para tizón foliar y roya común (Mapa N° 5).



### Sección:

En los maíces de siembra de segunda o tardíos que se encuentran en diversos estados fenológicos entre V8 y R3-R4 se detectan síntomas de tizón foliar por *E. turcicum* con baja incidencia en la mayoría de los híbridos, pero con alta incidencia y severidad, en híbridos susceptibles (Glagovsky, com. personal) en el E. de Entre Ríos.

Es imprescindible continuar el monitoreo en forma permanente y en especial, realizar el seguimiento del tizón foliar (Foto N° 3), enfermedad de rápido desarrollo bajo condiciones climáticas muy favorables.



Foto N° 2: Mancha violeta de las vainas del maíz con peritecios (puntos negros) de *Gibberella* spp



Foto N° 3: Tizón foliar (*Exserohilum turcicum*) en Maíz tardío.