
INFORME SEMANAL N° 786


Fecha: 2 de noviembre de 2017

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DESDE EL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Detalles: <p style="text-align: justify;">El mes de octubre cerró con jornadas inestables que alternaron con mejoras temporarias. Dentro de este contexto, con mucha variabilidad en las coberturas nubosas, la última lluvia importante se concretó entre miércoles y jueves de la semana pasada, repitiéndose en un evento menor en la última parte del domingo y el comienzo del lunes.



PRECIPITACIÓN ACUMULADA 25/10/17 al 31/10/17 (9hs 01/11)




Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Detalles: <p style="text-align: justify;">Las reservas de humedad calculadas a las 9 hs de ayer, presentaban un escenario donde la condiciôn adecuada predominaba en las dos terceras partes de la provincia, cayendo a niveles regulares en los departamentos del norte. Incluso algunas âreas reducidas del departamento La Paz, ténicamente ya transitan el comienzo de noviembre en estado de sequía.
Como mencionamos las lluvias han vuelto a gran parte de la regiôn pampeana y todo hace pensar que la provincia quedarâ totalmente expuesta a este nuevo evento pluvial. Se esperan de esta manera recomposiciones que logren alcanzar los departamentos del norte, evitando de esta manera que se afiance la sequía incipiente en el norte de La Paz.
Desde muchas estaciones automâticas de la red BCER, los reportes de lluvia indican registros que superan los 30 milímetros. El despliegue de nubosidad incluye a toda la provincia, aunque al presente, las tormentas tienen epicentro sobre Villaguay y Tala.
Entramos en un período en que las exigencias atmosféricas ya no darân margen como para compensar con reservas el salteo de sistemas precipitantes. Aquellas zonas que no queden incluidas en los eventos pluviales semanales, padecerân el retroceso de la humedad del perfil. Esta es una dinâmica conocida en suelos que necesitan mucha agua para mantenerse con el perfil cargado.
Un comportamiento pluvial deficitario, como el observado en octubre en varios departamentos del oeste y el sur provincial, no serâ lo ideal para el arranque de la gruesa. Pero, justamente, este evento parece estar despejando algunas dudas acerca de cômo sería la oferta de agua del mes de noviembre, presuntamente mejorada.</p>



ESTADO DE LAS RESERVAS al 01/11/17



METODO
FORTE LAY
AIFI I O

Sección: INFORME SUPERFICIE SEMBRADA CON COLZA EN EL CICLO 2017/18 EN ENTRE RÍOS

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos da a conocer el informe correspondiente a la superficie sembrada con colza en el ciclo agrícola 2017/18 en la provincia de Entre Ríos, Argentina.


El presente trabajo fue elaborado en base a datos aportados por la red de colaboradores, el procesamiento de imágenes satelitales y salidas a campo efectuadas por los profesionales de la institución.

La bolsa de Cereales de Entre Ríos agradece a la red de colaboradores por toda la información brindada para la elaboración de este informe.

Para ver el informe completo hacer click en el siguiente link

[INFORME COMPLETO](#)

Sección: CONDICIÓN DE MAÍZ DE PRIMERA



El estado fenológico del cultivo abarca desde emergencia a ocho hojas, aunque cabe aclarar que la mayor parte del área sembrada se posiciona entre tres a seis hojas. Los lotes en estado de emergencia son consecuencia de siembras muy tardías debidas a las reiteradas precipitaciones y en sitios puntuales a la necesidad de resiembras. La condición general del maíz a nivel provincial se resume del siguiente modo:

Muy bueno 24 %

Bueno 73 %

Regular 3 %

En la Figura 1 se puede apreciar la condición del cultivo por zonas.

Los colaboradores comunican que se continúan con las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. En algunos lotes se observó el ataque de orugas cortadoras y además se realizaron pulverizaciones para el control de cogollero.


Sección: CONDICIÓN DE GIRASOL

El estado fenológico de la oleaginosa en la provincia se extiende desde V2 (dos hojas) hasta R1 (botón floral) en los lotes sembrados en fechas tempranas.

Se determinó que el cultivo posee una condición evaluada como buena, con un buen estado sanitario y sin problemas debido al ataque de insectos (Figura 2).



Sección: SIEMBRA DE SOJA DE PRIMERA



El avance en la siembra de soja de primera en Entre Ríos se sitúa en el 8 %. Hasta el momento la siembra se ha presentado con un paso muy tranquilo, pero al comenzar el mes de noviembre (fecha óptima de siembra) tendrá un cambio rotundo en el ritmo, si las condiciones climáticas lo permiten.

En la Figura 3 se puede observar el avance de siembra por zonas, donde se destaca el Norte con un 19 %.

Sección: SIEMBRA DE ARROZ

A nivel provincial se implantó el 47 % de la superficie destinada a la producción de arroz. Las demoras ocasionadas por las precipitaciones provocaron una caída en el área con respecto al ciclo anterior.

El mayor avance se observó en el Norte del departamento La Paz que concretó el 65 % de la intención, mientras que las zonas de represas y de pozos se posicionan en 47 % y 44 % respectivamente.

Los colaboradores destacan que las intensas lluvias generaron el planchado de lotes y en algunos casos se han visto obligados a efectuar resiembras.

Sección: SIEMBRA DE SORGO

En base a consultas efectuadas a la red de colaboradores se determinó un avance en la siembra de sorgo del 15%.

Con respecto al ciclo 2016/17, se detecta una menor intención de siembra de sorgo del tipo granífero. Hasta el momento, la mayor parte de lo implantado corresponde a sorgo forrajero.